

PARAMARIBO BIO-PLATEAUX CONFERENCE


TRANSBOUNDARY RIVER BASINS CONFERENCE IN THE GUIANAS

October 31 to November 2 – 2024



Le Parc amazonien de Guyane

- **Parc national créé en février 2007**
- **Charte validée en 2013**
- **Zone de libre adhésion** 1.4 million d'hectares
Développement local durable, valorisation des cultures
- **Zone de cœur** 2 millions d'hectares
Protection de l'environnement avec réglementation spécifique reconnaissant :
 - *Les **modes de vie des communautés** tirant traditionnellement leur subsistance de la forêt;*
 - *Des **droits spécifiques aux habitants/résidents** pour les pratiques de chasse, pêche, cueillette, abattis et village.*
- **5 communes concernées**
Maripa-Soula, Papaïchton, Saül, Camopi, Saint-Elie >> 20 000 habitants
- **Etablissement public du Parc amazonien de Guyane:** 86 agents – 9 implantations – siège à Rémire-Montjoly



Principale menace : l'orpillage illégal



Lipo-Lipo (Maripa-Soula) : chantier et table(04/08/17)



Principale menace : l'orpaillage illégal



Site alluvionnaire

*Dégrad Roche
(Maripa-Soula) :
chantier (08/08/17)*



Cours d'eau turbide

*Eau Claire (Maripa-Soula) :
crique en zone cœur de parc (09/08/17)*




Cours d'eau turbide

Confluence Camopi et Oyapock




Impacts en terme de déforestation en Guyane (2000-2022)



- Nombreux impacts (manque de données) de l'activité illégale :
 - Destruction des lits mineurs des cours d'eau,
 - Turbidité des cours d'eau,
 - Contamination de la faune et des habitants au mercure,
 - Raréfaction des ressources naturelles,
 - Trafics associés,
 - ...
 - Cumul des déforestations minières en Guyane sur 2000-2022 >> **31 262 ha dont 5 600 ha sur le PAG**
- **2/3 des sites illégaux sont sur la moitié nord de la Guyane**




Végétation en 2015 sur les secteurs défrichés sur 2000-2015 (26 904 ha)



■ haute ■ basse ■ alterée ■ sol nu

Végétation 2015	Superficie (ha)	%	Végétation 2020	Superficie (ha)	%
haute	7 801	29	haute	14 349	46
basse	208	1	basse	10	0
altere	16 156	60	altere	12 544	40
sol nu	2 737	10	sol nu	4 357	14
TOTAL	26 904	100 %	TOTAL	31 262	100 %

Végétation en 2020 sur les secteurs défrichés sur 2000-2020 (31 262 ha)



■ haute ■ alterée ■ sol nu

Données complexes à analyser : repasse ...

Mais qu'en est il des milieux aquatiques ?



Enquête menée dans le cadre du projet Terra Maka'andi :

- Auprès de 43 personnes sur Papaïchton :

	Poissons	Gibiers	Abattis	Plantes	Bois	Fleuve
<i>Extrêmement dégradées</i>	29,82%	7,02%	1,75%	3,51%	3,51%	47,37%
<i>Dégradées</i>	63,16%	35,09%	8,77%	24,56%	36,84%	38,60%
<i>Bon état et stables</i>	5,26%	40,35%	59,65%	36,84%	36,84%	3,51%
<i>Bon état et amélioration</i>	0,00%	15,79%	15,79%	15,79%	17,54%	0,00%
<i>Vraiment saines et prospère</i>	0,00%	0,00%	8,77%	10,53%	0,00%	0,00%



- Auprès de respectivement 15 et 24 foyers sur Kayodé et Twenké/Taluen

<i>Extrêmement dégradées</i>	0,00 %	5,26 %	2,63 %	0,00 %	2,63 %	65,79 %
<i>Dégradées</i>	26,32 %	15,79 %	10,53 %	2,63 %	13,16 %	10,53 %
<i>Bon état et stables</i>	42,11 %	21,05 %	15,79 %	10,53 %	13,16 %	2,63 %
<i>Bon état et amélioration</i>	23,68 %	42,11 %	21,05 %	18,42 %	13,16 %	0,00 %
<i>Vraiment saines et prospères</i>	7,89 %	15,79 %	47,37 %	50,00 %	31,58 %	2,63 %

Conflit d'usage sur le Maroni

Figure 1. Zones de pêche sur le Maroni en 2014 pour des sorties de moins de 24 h

Source : Longin 2016 (PAG)



Sur les 9 300 km de cours d'eau pêchés (2014) par les Alukus et Wayanas en Guyane et au Suriname :

- 22% ont été impactés par de l'activité minière en amont en 2021
- 35 % l'ont été dans un rayon de 20 km autour des principales zones de vie 2021




Surfaces et linéaires impactés par l'orpaillage illégal (OI)

- Pas d'impact constaté (2010-2020)
- Impact sur 1 à 2 ans (2010-2020)
- Impact sur 2 à 4 ans (2010-2020)
- Impact sur 4 à 6 ans (2010-2020)
- Impact sur 6 à 8 ans (2010-2020)
- Impact sur 8 à 10 ans (2010-2020)
- Zones déforestées et exploitées par OI (depuis 2020)

Zones réglementées

- Limite de la Zone d'accès réglementée (ZAR)
- Zones de Droit d'Usage Collectif (ZDUC)
- PAG - Zone cœur
- PAG - Zone d'adhésion

Situation de l'orpaillage illégal sur le Parc amazonien de Guyane



CAMOPI: 14 sites (- 6 sites)

SAÛL: 3 sites (-1 site)


PAPAÏCHTON: 28 sites (- 6 sites)


MARIPASOULA: 67 sites
(-19 sites)

85% de l'activité sur l'OUEST



Conflit d'usage sur le bassin de la Campi (Oyapock)







Plus de 550 km² travaillés par l'exploitation minière dans le bassin du Maroni entre 2000 et 2022

Peut paraître une faible superficie à l'échelle du bassin versant (65 000 km²) mais activité en grande partie centrée sur les cours d'eau

Impacts de l'orpaillage sur le bassin versant du Maroni




Pressions sur les cours d'eau



Plus de 10 000 km de cours d'eau sont travaillés en amont (2022)

Il n'y a plus que 20% du cours principal du Maroni (hors affluents) épargné en 2024 par l'activité minière

Impacts de l'orpaillage sur le bassin versant du Maroni



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION.



www.bio-plateaux.org

